

Calendrier vaccins — Chien ■

Protocole indicatif selon les standards OMVQ et AAHA 2026, pour le Québec.

Série chiot (8 à 16 semaines)

Âge	Vaccin de base	Vaccins selon mode de vie	Notes
8 semaines	DHPP #1 (Carré, Hépatite, Parainfluenza, Parvovirus)	Bordetella si garderie/pension prévue	Vermifuge si non fait par éleveur
12 semaines	DHPP #2	Bordetella rappel Leptospirose #1 si zone à risque	Microchip recommandé à ce stade
16 semaines	DHPP #3 Rage (premier vaccin)	Leptospirose #2 Lyme #1 si zone à risque (Estrie : oui)	Stérilisation à discuter dès cet âge
1 an	Rappel DHPP + Rage	Rappels lifestyle vaccins	Examen complet + bilan jeune adulte

Adulte (1 an à 7 ans)

Vaccin	Fréquence	Indication
DHPP (Carré-Hépatite-Parainfluenza-Parvovirus)	Tous les 3 ans	Tous les chiens
Rage	Tous les 3 ans (Defensor 3)	Tous — obligatoire pour voyage, recommandé municipalité
Bordetella (toux de chenil)	Annuel	Garderies, pensions, dressage, contact avec autres chiens
Leptospirose	Annuel	Tous chiens avec accès extérieur en Estrie (rivières, ruisseaux)
Lyme	Annuel	Tous chiens avec accès extérieur en Estrie (zone endémique)

Prévention parasites — Estrie

Mois	Action recommandée
Avril	Démarrage prévention tiques/puces/vers du cœur (NexGard Spectra, Simparica Trio, Advantage Multi)
Mai	Test SNAP 4Dx annuel (Lyme + Anaplasma + Ehrlichia + ver du cœur)
Juin → octobre	Prévention mensuelle continue
Novembre	Dernière dose, puis pause hivernale
Décembre → mars	Pas de prévention requise (sauf voyage Sud/USA)
Annuel	Analyse de selles (vers intestinaux)

Sénior (7 ans+ pour grandes races, 10 ans+ pour petites)

Bilan gériatrique recommandé tous les 6 mois : examen complet, prise de sang (hématologie + biochimie), analyse d'urine, tension artérielle. Vaccins maintenus selon le protocole adulte. *Service possible à domicile pour les chiens*

fragiles ou peu mobiles.

Calendrier vaccins — Chat ■

Protocole indicatif selon les standards OMVQ et AAFP 2026, pour le Québec.

Série chaton (8 à 16 semaines)

Âge	Vaccin de base	Vaccins selon mode de vie	Notes
8 semaines	FVRCP #1 (Rhinotrachéite, Calicivirus, Panleucopénie)	—	Vermifuge + test FeLV/FIV recommandé
12 semaines	FVRCP #2	FeLV #1 si extérieur ou maison multi-chats	Multichats recommandé
16 semaines	FVRCP #3 Rage (Purevax — non-adjuvanté pour chat)	FeLV #2	Stérilisation à 5-6 mois recommandée
1 an	Rappel FVRCP + Rage	Rappel FeLV	Examen complet + bilan jeune adulte

Adulte (1 an à 8 ans)

Vaccin	Fréquence	Indication
FVRCP (Rhinotrachéite-Calicivirus-Panleucopénie)	Tous les 3 ans	Tous les chats
Rage (Purevax)	Tous les 3 ans	Recommandé même intérieur strict (chauves-souris en Es)
FeLV (Leucose féline)	Annuel	Chats avec accès extérieur ou maison multi-chats
Test FeLV/FIV	À l'adoption, puis selon exposition	Stions nouveau chat + après contact à risque

Chat sénior (10 ans+, ou 8 ans+ pour races à risque)

Examen	Fréquence	Pourquoi
Examen complet + poids	Tous les 6 mois	Détection précoce : perte de poids = signal majeur chez chat sénior
Bilan sanguin (hémato + biochimie + T4 thyroïdien)	Annuel	Insuffisance rénale, hyperthyroïdie, diabète — 3 maladies les plus comm
Analyse d'urine (densité + protéines)	Annuel	Diagnostic IRC précoce (souvent silencieuse jusqu'à stade 3)
Tension artérielle	Annuel	Hypertension fréquente — souvent secondaire à IRC ou hyperthyroïdie

Prévention parasites — Chat

Profil	Prévention recommandée
Intérieur strict	Vermifuge annuel (Profender ou Drontal). Pas de prévention tiques nécessaire.
Accès extérieur ou maison avec chier	Prévention mensuelle Advantage Multi ou Revolution Plus (mai-octobre). Vermifuge x2/an.
Chat de campagne (Estrie)	Prévention mensuelle continue mai-novembre. Test FeLV annuel.

■ **Important** — **vaccin non-adjuvanté pour chat** : exigez le vaccin rage **Purevax** (non-adjuvanté) plutôt que *Defensor 3*. Risque réduit de sarcome au site d'injection chez le chat.